

Tonda Gentile delle Langhe (Trilobata)

DESCRIZIONE CRESCITA

Vigore albero - Intermedio [5]

Crescita albero - Semi eretto [3]

Densità ramificazione - Intermedio [5]

Polloni - Forti [7]

DESCRIZIONE GERMOGLIO

Colore germoglio - Verde

Forma germoglio - Globulare

DESCRIZIONE FOGLIA

Forma della foglia - #

DESCRIZIONE SHOOT

Un anno shoot spessore - Medio [5]

Un anno shoot pelosità - Medio [5]

Un anno shoot densità di lenticelle - Molto Alto [9]

INFIORESCENZA

Colore dei giovani fiori - Rosso

NOCE E NOCCIOLO

Costruzione involucro - Assente

Lunghezza involucro comparato alla lunghezza del nocciolo - Lungo [7]

Dentellatura involucro - Medio [5]

Dentellatura della rientranza sull'involucro - Medio [5]

Spessore involucro alla base - #

Densità pelosità involucro - Alto [5]

Giunzione di brattee sull'involucro - Assente

Numero predominante di nocciolo per gruppo - #

Forma nocciolo - Globulare [2]

Forma noce della sezione trasversale - Triangolare

Colore guscio - Marrone chiaro

Stracciatura guscio - #

Forma della cima della nocciola - Ottuso

Predominanza cima della nocciola - #

Dimensione del pistillo - Piccolo [3]

Peluria alla sommità della nocciola - Debole [3]

Dimensione della base della nocciola in relazione alla dimensione della nocciola - Piccolo [3]

Curvatura della base della nocciola - #

Forma del nucleo - Globulare

Rotondità nocciola - #

Consistenza nocciola - Medio Sugheroso [5]

Sbiancamento nocciola (per facilitare la rimozione della pellicola) usando 155° C per 20 minuti - Buono [7]

Misura della cavità interna della nocciola - Medio [5]

Attecchimento riferimento standard - Inizio stagione [3]

Dicogamia - Protandrous

Caduta nocciolo - Libero dalla buccia

DESCRIZIONE PIANTE

Bisogna di boccioli vegetativi (basato su Mehlenbacher, 1991. Numero della temperatura sotto i 7°C)

